

HONKAJOKI LAUHALA HIETARANTA/ KM 33137

Päivi Kankkunen 2003

Luuanalyysi 24.02.2004 Katariina Nurminen

Analyysissä tutkittiin tarkemmin asuinpaikalta tunnistetut särkikalojen (Cyprinidae) nieluluut ja muutamat muut yksittäiset luut. 14 luufragmenttia pystyttiin tunnistamaan lajilleen.

KM 33137: 353	os pharyngeum inf. dex. sup. fr.	Rutilus rutilus
KM 33137: 374	os pharyngeum inf. dex. sup. fr.	Rutilus rutilus
KM 33137: 390	os pharyngeum inf. dex. sup. fr.	Scardinius erythrophthalmus
KM 33137: 418	basioccipitale fr.	Abramis ballerus
	os pharyngeum inf. sin. sup. fr.	Leuciscus cephalus
	os pharyngeum inf. dex. sup. fr.	Leuciscus cephalus
KM 33137: 489	os pharyngeum inf. sin. sup. fr.	Rutilus rutilus
KM 33137: 506	os pharyngeum inf. sin. sup. fr.	Scardinius erythrophthalmus
KM 33137: 519	os pharyngeum inf. sin. sup. fr.	Scardinius erythrophthalmus
KM 33137: 550	os pharyngeum inf. sin. sup. fr.	Scardinius erythrophthalmus
KM 33137: 622	os pharyngeum inf. sin. fr.	Leuciscus cephalus
KM 33137: 639	os pharyngeum inf. sin. sup. fr.	Scardinius erythrophthalmus
KM 33137: 680	os pharyngeum inf. dex. sup. fr.	Rutilus rutilus
KM 33137: 683	os pharyngeum inf. sin. sup. fr.	Scardinius erythrophthalmus

Lajien minimiyksilömäärät ovat seuraavat:

Abramis ballerus (sulkava)	1
Leuciscus cephalus (turpa)	2
Rutilus rutilus (särki)	3
Scardinius erythrophthalmus (sorva)	5

Katariina Nurminen